

Gegevens patiënt

Naam: _____ Pin nr (intern): _____
 Geb.datum: _____ BSN (extern): _____
 Adres: _____ Geslacht: M / V
 Postcode/Plaats: _____

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (arts): _____ Afdeling: _____
 Naam ziekenhuis: _____ Telefoonnr/sein: _____
 Adres: _____ Fax: _____
 Postcode/Plaats: _____ Projectnr.: _____

Toelichting bij de aanvraag / co-medicatie

Gegevens te bepalen geneesmiddel(en)

Preparaat	Dosering	i.v./oraal	Sinds	Tijdstip en datum laatste toediening
..... d.d. mg : op / / 20
..... d.d. mg : op / / 20

DIT BLOK ALTIJD INVULLEN!

Afnamegegevens

Afnamedatum: / / 20
 Afnametijd: :
 Gewicht patient: kg

Reden van aanvraag

- Controle, klinisch goed ingesteld
- Vermoeden van therapie-ontrouw
- Vermoeden van subtherapie
- Vermoeden van overdosering
- Vermoeden van intoxicatie
- Vermoeden van interactie met _____
- _____

CITO alleen i.o.m. apotheker via (024) 361 41 63

Codes afnamematerialen z.o.z.

Antibiotica

p4

- Amikacine dal
- Amikacine top
- Gentamicine dal
- Gentamicine top
- Tobramycine dal
- Tobramycine top
- Vancomycine dal
- Vancomycine top
- Vancomycine continu
- _____

Tijdstippen bloedafname en start infuus altijd vermelden!

- Dosering: mg
- Interval: uur
- Tijdstip start infuus: uur
- Bloedafname: dal: uur
- top: uur
- anders: uur

Antivirale middelen

k4

- Aciclovir
- Ribavirine
- _____

Oncolytica

k4

- Abiraterone (aanleveren op ijs)*
- Enzalutamide
- Etoposide k4/p4
- Methotrexaat T = uur (p4)
- _____ altijd aanmelden!
- _____
- Imatinib
- Sunitinib + desethylsunitinib
- Pazopanib

Anti-epileptica

p4

- Carbamazepine
- Fenobarbital
- Fenytoïne
- Vrije concentratie fenytoïne
- Valproïnezuur
- Vrije concentratie valproïnezuur
- _____

Antiretrovirale middelen

k4

- Abacavir
- Atazanavir
- Cobicistat
- Darunavir
- Didanosine
- Dolutegravir (aanleveren op ijs)*
- Efavirenz
- Elvitegravir
- Emtricitabine
- Etravirine
- Fosamprenavir
- Indinavir
- Lamivudine
- Lopinavir
- Nevirapine
- Raltegravir
- Rilpivirine
- Saquinavir
- Tenofovir
- Tipranavir
- Zidovudine
- _____

Antimycotica

p4

- Anidulafungine (aanleveren op ijs)*
- Caspofungine (aanleveren op ijs)*
- Flucanazol
- Flucytosine dal
- Flucytosine top
- Itraconazol
- Micafungine
- Posaconazol
- Voriconazol
- _____

Tuberculose-middelen

p4

Afnemen of op 2 uur of op 2, 4 en 6 uur na toedienen (farmacokinetische curve, z.o.z.)

- Ethambutol
- Isoniazide (aanleveren op ijs)*
- Moxifloxacin
- Pyrazinamide
- Rifampicine (aanleveren op ijs)*
- _____

Opmerking: op droogijs aanleveren

Diversen

p4

- Coffeine
- Digoxine
- Theofylline
- Thiopental/Pentobarbital
- _____

Immunosuppressiva

k4

- Mycofenolzuur
- _____



* Overleg met laboratorium apotheek over transportcondities

